

2023-2024 学年度潍坊市二年级下学期学业考试

护理专业知识二卷 2 (外科+妇产) 试题

本试卷分卷一(选择题)和卷二(非选择题)两部分,满分100分,考试时间60分钟,考生请在答题卡上答题,考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

卷一(选择题,共50分)

一、选择题(本大题 25 小题,每题 2 分,共 50 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请将符合题目要求的选项字母代号选出,并涂在答题卡上)

1. 关节脱位特殊体征是

- A. 肿胀 B. 压痛 C. 弹性固定 D. 骨擦音

2. 乳癌病变发展过程中最易累及

- A. 肺 B. 肝 C. 腋窝淋巴结 D. 锁骨下淋巴结

3. 气胸病人患侧肺部叩诊音为

- A. 清音 B. 浊音 C. 鼓音 D. 实音

4. 不符合脑震荡表现的是

- A. 逆行性健忘 B. 颅内压增高
C. 意识障碍不超过 30 分钟 D. 神经系统检查无异常

5. 巡回护士的职责不包括

- A. 检查手术前设备及手术需用物品
B. 核对病人姓名、床号、施术部位
C. 术中观察病情变化,执行口头医嘱,配合抢救
D. 术毕整理手术台和清洗器械

6. 正常分娩第二产程处理哪项不妥

- A. 勤听胎心 B. 指导产妇正确使用腹压
C. 经产妇宫口开大 4~5cm 时立即刷手 D. 协助胎头内旋转

7. 下列关于流产的描述中,错误的是

- A. 先兆流产可以保胎治疗 B. 不全流产可以引起失血性休克
C. 难流产应尽快清空宫内容物 D. 完全流产应常规清宫

8. 28 岁孕妇,妊娠 37 周,腹部触诊:宫底部可触及不规则、易变形、宽大而软的胎儿部分,腹部右侧凹凸不平,左侧相对平坦,胎心在脐下左侧听的最清楚。该孕妇的胎儿胎位可能是

- A. 枕右前位 B. 枕左前位 C. 骶右前位 D. 骶左前位

9. 关于无排卵型功血,下述哪项是错误的:

- A. 多见于青春期及更年期 B. 基础体温呈单相型
C. 周期短,规律且经量多少不定 D. 月经前刮宫,内膜为增生期

10. 下列哪项不是骨盆外测量的径线

- A. 髂棘间径 B. 髂嵴间径 C. 坐骨结节间径 D. 坐骨棘间径

11. 急性阑尾炎的典型临床表现包括

- A. 腹泻、发热、右下腹痛
B. 突发右下腹绞痛、板状腹、右下腹压痛
C. 右下腹绞痛,向会阴部放射,恶心、呕吐
D. 转移性右下腹痛,恶心、呕吐,右下腹压痛

12. 肝细胞癌的早期诊断,最有价值的是

- A. 甲胎蛋白检测 B. 腹腔镜检查
C. B 型超声波检查 D. β 2 微球蛋白测定

13. 全胃肠外营养护理不正确的是

- A. 营养液在无菌条件下配制 B. 现配现用
C. 暂时不输的营养液常温放置 D. 营养液 24 小时内输完

14. 硬脊膜外麻醉最危险的并发症是

- A. 呼吸抑制 B. 全脊髓麻醉
C. 神经根损伤 D. 血压下降

15. 6 岁小孩双上肢烧伤,烧伤处水疱较大,剧痛,判断烧伤面积及深度为

- A. 15% 浅 II 度烧伤 B. 18% 浅 II 度烧伤
C. 20% 深 II 度烧伤 D. 24% 深 II 度烧伤

16. 腹部损伤造成腹腔器官破裂,以出血为主要表现的是

- A. 肝破裂 B. 胃破裂
C. 小肠破裂 D. 胆囊破裂

17. 行胸腔闭式引流的患者,导管脱出后首选的护理措施是

- A. 夹闭导管并更换
- B. 将导管重新放入胸腔
- C. 双手捏紧放置导管处皮肤
- D. 立即缝合引流口

18. 王某，女，32岁，G2P2，胎儿娩出后出现持续大量阴道流血，鲜红色、可凝，量约800ml。最可能的原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 宫颈裂伤
- C. 胎盘残留
- D. 凝血功能障碍

19. 葡萄胎最常见的表现是

- A. 腹痛
- B. 子宫异常增大
- C. 停经后阴道流血
- D. 妊娠呕吐

20. 异位妊娠最常发生的部位是

- A. 输卵管壶腹部
- B. 输卵管峡部
- C. 卵巢
- D. 腹腔

21. 李某，女，29岁，G3P1，听诊胎心音在脐上方左侧最清楚。其胎方位是

- A. 骶左前
- B. 骶右前
- C. 枕左前
- D. 枕右前

22. 赵某，女，42岁，平卧屏气向下用力时，子宫颈外口达处女膜缘，在阴道口可见子宫颈。其子宫脱垂的分度是

- A. I度
- B. II度
- C. III度
- D. IV度

23. 产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是

- A. 孕妇体重
- B. 胎方位
- C. 宫高与腹围
- D. 胎动

24. 关于围绝经期综合征的临床表现，下列描述不正确的是

- A. 月经紊乱
- B. 潮热
- C. 阴道分泌物增多
- D. 骨质疏松

25. 初产妇，孕35周，因有液体从阴道流出院。查体无腹痛，肛诊时触不到羊膜囊，上推胎儿先露部可见到流液量增多。应考虑为

- A. 先兆流产
- B. 先兆早产
- C. 临产
- D. 胎膜早破

二、简答题（本大题4个小题，共38分）

1. （本小题9分）简述静脉补钾的注意事项。
2. （本小题6分）葡萄胎的临床表现有哪些？
3. （本小题8分）简述低钾血症的常见病因及身体状况。
4. （本小题7分）简述颈椎病的病因及临床分型。
5. （本小题8分）请写硫酸镁的毒性表现及用药注意事项。

三、综合分析题（本大题1个小题，共12分）

1. （本小题12分）患者，男性，30岁。因腹外伤而出现面色苍白，四肢湿冷，脉搏细数，血压60/40mmHg。血常规检查：RBC： $2.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb：60g/L。诊断为肝破裂，失血性休克急需输血。

请回答：

- （1）该患者存在的护理诊断有哪些？（4分）
- （2）请写出腹部损伤手术后的护理措施。（8分）